

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 30-9-74 078819

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## EDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

55 Rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

Tél. 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 30 F

C. C. P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D. D. A.

55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3\*

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

BULLETIN n° 18

29 Août 1974

### VIGNE

BOTRYTIS et OIDIUM - La protection reste nécessaire seulement dans les parcelles où ces maladies se sont manifestées, dans les limites d'utilisation des fongicides.

VERS DE LA GRAPPE - ( Eudemis ) - Un traitement à caractère "curatif" devra encore être appliqué dès réception, dans tous les vignobles à l'exception de ceux des régions 131, 132 et 152 où l'activité de la 3ème génération est terminée. On devra toutefois respecter les dates limites d'utilisation indiquées pour les divers insecticides utilisés.

### ARBRES FRUITIERS

( respecter strictement les dates limites d'emploi des pesticides )

CARPOCAPSE ET TORDEUSE ORIENTALE ( suir fruits à pépins ) -

1° - Au sud d'une ligne Tain - St Lattier et dans le bassin d'Aubenas, l'activité de la 2ème génération du Carpocapse est terminée mais elle est relayée par une très forte population de la Tordeuse Orientale, de sorte que la protection reste nécessaire sur fruits à pépins à proximité des vergers de pêcheurs à l'aide d'un produit efficace contre la Tordeuse Orientale.

2° - Dans toutes les autres zones la 2ème génération du Carpocapse restera active jusqu'au 12 septembre et après cette date seule la Tordeuse Orientale restera à craindre. Ainsi la protection des fruits à pépins devra être maintenue jusqu'au 12 septembre à l'aide d'un produit efficace contre les 2 ravageurs et prolongée au delà de cette date et jusqu'à nouvel avis seulement à proximité des vergers de pêcheurs.

POU DE SAN JOSE - (Zones contaminées) - Le traitement conseillé par le bulletin précédent devra être renouvelé environ 3 semaines après la première application. Un produit également efficace contre le Carpocapse et la Tordeuse Orientale pourra être utilisé si les dates de ces différents traitements concordent. On visera alors à la fois la frondaison et la charpente.

### CULTURES DIVERSES

MILDIOU DE LA TOMATE - Cette maladie ne présente actuellement aucun danger, du moins dans les parcelles qui ne sont pas irriguées par aspersion.

PYRALE DU MAIS - La 2ème génération de papillons est apparue mais l'état de la végétation rend tout traitement superflu.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la Circonscription Rhône-Alpes : A. PITHIOUD

L'Ingénieur d'Agronomie chargé des Avertissements agricoles : P. LATARD

Le Technicien chargé des questions maraîchères : G. FERAND

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes - Directeur Gérant : L. BOUYX

P 198